

Bariadorgia biela

Vass8R09s176-180



INRA

SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

119Mpb8


8 R 9 s - 176 - 180
Bariadorgia biela


Bariadorgia biela

8 R 9 s - 176 - 180









CLOS 8 RANG 9 Souche 176-180
Désignation : *Banadorgia breia-Cucujolo*
CHARGE : Année : *04908*
Véraison : 4-8
Maturité : 12-9-88
Mill.: 1 Pour.: 0
GRAPPE : G - M - P - Dim.: 12
L - M - C
Vigueur : 2
PORT : érig - 1/2 érig - couché
BAIE : Année :
TG - G - M - P - Dim.: 15
disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
s1 0 Avec pépins - apyrène
s2 3 JUS : inc. - coloré
s3 4
s4 1
s5 0

ANNEE 1987

NOM *Bariadorgia biela* EMPLACEMENT 8 R9 176-180

8

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	27.3	31.3	2								
2	4	31.3	3.4	1								
3	5	31.3	3.4	3		5.6	10.6	16.6	3.8	6.8	10.8	14.9
4	4	27.3	31.3	0						+2		+4
5	4	23.3	27.3	1								
21			31.3	7	3		10.6					Port mi'cigi Vigueur 2
			+4				+3					

ANNEE 1988

NOM *Bariadorgia biela* EMPLACEMENT 8 R9 176-180

8
+

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	5.4	8.3	0								
2	2	—	28.3	3								
3	4	25.3	28.3	4	6	31.5	3.6	6.6	4.8	8.8	10.8	42.9
4	2	—	28.3	1								
5	2	25.3	25.3	0								
		Pourriture :		0	Port :	mi'cigi	Vigueur :	2 faible				+4
			28.3				3.6			+3		
			+4				+3					

ANNEE 1989

NOM *Bariadorgia biela*
= Carcajolo bl 04308

EMPLACEMENT 8 R9, 176-180

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	20.3	23.3	0								
2	2	20.3	23.3	1		24.5						
3	3	16.3	20.3	0	15		27.5	30.5	24.7	2.8	7.8	4.9
4	3	16.3	20.3	1	1	24.5	0			+2		+4
5	2	13.3	16.3	0								

Pourriture : 0

Mill. : 50%

Port : mi'enge'

Vigueur : 25

1 le 20.3.89 + 2

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Bariadorgia biela
el 8 Rg s 176-180 (s. 178)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Bariaudorgis biela

8 R 9 s-176-180 (s. 179)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 87

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Bariadorgia biela

8 Rgs-176-180 (s. 178)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
~~sans~~ ^{avec} villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - ~~sans~~ ^{avec} villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 87

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Bariadorgia biela
8 Rgs. 176-180 (s. 177)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions : x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte (73).

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (76).

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté (78) - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (81).

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne (84) - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière ^{passer} - irrégulière (dimensions : 16 x).

De couleur blanc (87) - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée (92) - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde (96) - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -
troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière (107) - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (111).

A saveur neutre (112) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -
herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen (120) - court 121.

A pédicelle de couleur : verte (122) - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte (125) - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent (129).

A pinceau : court 130 - moyen (131) - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré (134).

A peau fine (135) - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse (139) - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

DENOMINATION : *Bariadorgia biela*
EMPLACEMENT : *8 R 9 176. 180 (2)*
(un peu faible)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88

N° d'ordre : 0119.08
Désignation : *Bariadorgia biela*
Emplacement : 8 R 9 A 176 - 180

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L₂ : 7 - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - ⑯
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ㉓ - ㉔
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉖ - ㉗ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : ㉘
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - ㉚ - ㉛ - ㉜ - 38-
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉝ - en U : ㉞ - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉟
Dents : forme : ㊱ - ㊲
Dents (angle) : ㊳ - ㊴ - ㊵
Angle du lobe terminal : ㊶ - ㊷ - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : ㊸ - ㊹ - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ㊻ - ㊼ - ㊽ - 56 - 57 - 58-
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊾ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - ㊿ - ㊿ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remmes 90